

L'Engoulevent d'Europe

(*Caprimulgus europaeus*)




© C. LECOQ

"têteur de chèvre". Il était en effet soupçonné de traire le lait caprin sans autorisation. Son étymologie française est plus proche de la réalité : "avaleur d'air". Insectivore strict, il vole le bec très largement ouvert pour capter les papillons dont il est friand. L'Engoulevent d'Europe est le représentant local des 85 espèces de la famille des *Caprimulgidae*, espèces surtout concentrés sur l'hémisphère Sud.

RECONNAISSANCE - INDICES DE PRESENCE

L'Engoulevent, comme la plupart des oiseaux crépusculaires, véhicule une légende qui inspirait méfiance à son égard : étymologiquement, *Caprimulgus* se traduit du latin par



HABITAT DE L'ESPÈCE

→ L'Engoulevent d'Europe affectionne particulièrement les landes, les pierriers, les friches basses et les grandes coupes rases. Les jeunes plantations et les recrus de taillis lui sont favorables pendant 3 à 5 ans. Ce sont des milieux riches pour la chasse au crépuscule.

→ Il chasse en forêt feuillue ou résineuse, et évolue plus facilement en peuplements clairs ou clairières. Il exploite également les milieux ouverts (il affectionne les troupeaux au pâturage pour le cortège d'insectes qui les accompagnent !).

→ Son territoire couvre quelques kilomètres carrés (en fonction de sa richesse).

→ Son régime est purement insectivore et il affectionne particulièrement les papillons, mais également toutes sortes d'insectes qu'il capture essentiellement en vol, à la manière d'une hirondelle.

Description

- **Identification** - La couleur "feuilles mortes" de son plumage le rend particulièrement discret quand il est posé au sol. La dominance est brun-gris moucheté de noir et de roux. Le mâle présente des taches blanches à l'extrémité inférieure des ailes et sous la queue (absentes chez la femelle). Les longues plumes filiformes qui entourent son bec lui servent de "filet à papillon". Elles sont caractéristiques.

- **Biométrie** - Taille : 26 à 28 cm - Envergure : 54 à 60 cm - Poids : 75 à 100 g - L'Engoulevent est de la taille d'un gros merle.

- **Comportement** - Il chasse au crépuscule ou pendant la nuit. Ses vols de chasse sont généralement bas. Il passe la journée couché au sol ou posé sur une branche horizontale.

- **Vol** - En chassant les insectes, il a un vol "fantaisiste", rapide et silencieux. Dérangé le jour, il s'enfuit en rasant la végétation et le silence de son vol est caractéristique...

- **Indice de présence** - Migrateur, il n'est observable que de mi-avril à septembre. Son chant est un ronronnement continu (émis sur plusieurs minutes) et sonore se terminant par une courte modulation plus douce et musicale. Il claque sèchement ses ailes de temps à autre (bruit de "coup de fouet"). L'écoute à l'aube ou à la tombée de la nuit est le meilleur moyen de déceler la présence de cet oiseau par ailleurs extrêmement discret.

- **Nid** - La femelle pond ses œufs à même le sol dans une légère dépression. Les deux œufs de la nichée sont blanc-crème avec des marbrures brunes.

- **Nidification** - Ponte fin mai pour une couvaison de 18 jours. Les petits volent moins de trois semaines après l'éclosion. Une seconde couvée d'été est assez fréquente en juillet.

Intérêt écologique

→ L'Engoulevent d'Europe est une espèce nicheuse migratrice protégée au niveau national et inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux (A224 - Natura 2000). Il est signalé sur 1 site Natura 2000 en Haute-Normandie et sur 2 sites Natura 2000 et sur 27 ZNIEFF en Basse-Normandie. Il est probablement présent partout en Normandie.

→ Il contribue aux grands équilibres forestiers en régulant notamment les populations de papillons défoliateurs.

L'Engoulevent d'Europe



© C. LECOQ



Notes de terrain :

GESTION DE L'ESPÈCE

Objectif général de gestion

Maintenir ou favoriser une gestion diversifiée des massifs forestiers, qu'ils soient feuillus ou résineux, et quel que soit le mode de traitement.

Gestion sylvicole

Gestion sylvo-environnementale

Gestion environnementale

↘ La notion de gestion de massif est plus importante que la notion de gestion de peuplement. Le maintien d'une **mosaïque de parcelles**, où les modes de traitements forestiers habituels sont pratiqués, procure à l'Engoulevent des territoires de chasse diversifiés.

↘ Il n'y a pas d'indication sylvicole spécifique particulièrement favorable à l'espèce.



↘ La phase de **régénération artificielle** en coupes rases sur des surfaces significatives (plusieurs hectares) lui est très favorable pour la nidification. La nature de l'essence plantée n'a aucune importance.



Actions à favoriser pour une gestion optimale de l'habitat

↘ Eliminer l'utilisation de tout produit agropharmaceutique, contre les insectes notamment.

↘ Maintenir des landes et des milieux ouverts.

↘ Limiter la fréquentation humaine des zones de nidification entre juin et juillet.

↘ Concentrer les périodes de dégagement sur début mai ou fin août, selon la végétation à combattre.

↘ Planifier les dépressages en période hors feuilles.



↘ Evolution à l'échelle d'un massif vers un traitement en **taillis simple** prépondérant avec coupes de taillis équilibrées.



A EVITER

↘ Evolution homogène à l'échelle de grands massifs vers la **futale irrégulière**.

↘ Eviter les dégagements de plantation en période de nidification.

↘ Eviter le reboisement des landes et pierriers (milieux très riches pour l'espèce).



Remarque importante : L'Engoulevent à collier roux, espèce voisine, vient très rarement nicher en France. Sa rencontre reste peu probable en Normandie.