

Le Grimpereau des bois

Grimpereau familier
(*Certhia familiaris*)




© D. T'KINDT

RECONNAISSANCE – INDICES DE PRÉSENCE

Le Grimpereau des bois n'est que très peu présent en Normandie. Il est principalement présent dans les collines normandes. Son aire de répartition

optimale se trouve bien plus au Nord et à l'Est de l'Europe jusqu'au Japon, en passant par les îles britanniques et le centre de l'Hexagone. C'est un oiseau à caractère très forestier.



Description

- **Identification** - La distinction avec son cousin le Grimpereau des jardins n'est pas aisée. Le Grimpereau des bois a le ventre plus blanc, le sourcil blanc net, les ongles plus longs et le bec plus court. Son dos est brun, strié de tâches blanches et brun clair, sa queue est rousse. La forme de son bec est caractéristique, il est fin, assez long et recourbé. En vol, une barre fauve claire sur les ailes est visible.
- **Biométrie** - Taille : 12 cm, bec compris - Envergure : 17,5 à 21 cm - Poids : 8 à 11 g.
- **Comportement** - Le Grimpereau des bois est relativement discret, la teinte de son plumage lui permet de se confondre avec l'écorce des arbres. Il passe sa journée à escalader les arbres en quête de nourriture (araignées, insectes, ...). A l'aide de sa queue il se propulse le long du tronc à la manière des pics et monte en spirale jusqu'aux premières branches du houppier ou parfois jusqu'à la cime, en fonction des potentiels refuges de ses proies. Ses longues griffes lui permettent d'arpenter les écorces les plus lisses. En saison hivernale, il n'est pas rare de retrouver quelques rassemblements de grimpereaux dans des petites cavités ou décollements d'écorce, le plus souvent à proximité d'une source de nourriture. Il arrive parfois qu'il se mêle à de petits groupes de mésanges en recherche de nourriture.
- **Vol** - Il vole d'un arbre à l'autre, le plus souvent il décolle de la cime ou des premières branches du houppier d'un arbre pour atterrir au pied d'un arbre voisin.
- **Indice de présence** - Peu d'indices permettent d'identifier la présence de ce petit passereau, hormis peut-être son chant, correspondant à une répétition de notes aiguës terminée par un petit phrasé mélancolique de quelques secondes.
- **Nid** - Seule la femelle confectionne le nid, généralement dans des écorces soulevées, des tas de bois ou encore dans le creux d'une fourche. Il est composé de deux entrées avec une assise solide à base de branchettes sèches et de feuilles mortes. La partie centrale du nid est construite à partir de mousses, poils, crins et plumes.
- **Nidification** - Ponte de fin avril à mi-mai, de 5 à 6 œufs (blancs grossièrement tachetés de brun foncé), qui sont couvés pendant 2 semaines par la femelle. Les jeunes restent un peu plus de 2 semaines au nid avant de s'envoler et commencer l'exercice indispensable de l'escalade.


Intérêt écologique



- Le Grimpereau des bois est une espèce sédentaire qui est protégée au niveau national et est citée à la Convention de Berne - Annexe II (liste des espèces de faune strictement protégées).
- L'espèce est signalée dans 7 ZNIEFF en Basse-Normandie et 2 en Haute-Normandie.

Habitat de l'espèce

- Le Grimpereau des bois préfère les vieux arbres à écorce lisse. Ainsi, il vit principalement dans les hêtraies d'âge mûr. Il est possible de le retrouver dans les peuplements mixtes ou monospécifiques de résineux, plus principalement d'Épicéa et de Sapin de Normandie.
- Son régime alimentaire spécialisé est composé d'insectes, de cloportes, d'araignées, de larves, de chrysalides et d'œufs.
- Il a été estimé qu'en une journée ce Grimpereau peut escalader entre 250 et 300 arbres, soit près de 2 à 3 km de troncs et de branches.




© D. T'KINDT

Grimpereau des bois

Le Grimpereau des bois

Grimpereau familier (*Certhia familiaris*)



© D. T'KINDT

GESTION DE L'ESPÈCE

Objectif général de gestion

Maintenir de vieux peuplements feuillus ou résineux ainsi que des corridors boisés entre eux.
Conserver du bois mort, des arbres dépérissants ou sénescents au sein des massifs où l'espèce est présente.

Gestion sylvicole

Les modes de traitement qui permettent le maintien à long terme de gros bois sont favorables au Grimpereau des bois : futaie irrégulière, taillis-sous-futaie. Une gestion sylvicole dynamique en futaie régulière lui est moins favorable, principalement en peuplements résineux où les gros bois sont rapidement exploités.

Un peuplement feuillu d'âge mûr, en futaie régulière lui sera plus favorable.



FAVORISER

A ÉVITER

- La sylviculture à rotations raccourcies, sur de grandes surfaces, (essences résineuses ou feuillues).



La phase de renouvellement des futaies régulières peut avoir un impact sur l'habitat du Grimpereau

- Privilégier un renouvellement par régénération naturelle avec une coupe d'ensemencement et des coupes secondaires progressives, qui maintiennent autant que possible des gros bois, en parallèle de l'acquisition de semis.



FAVORISER

A ÉVITER

- Coupes à blanc sur de grandes surfaces.



Gestion sylvo-environnementale

Futaie mixte irrégulière

- Rechercher le maintien de la structuration verticale du peuplement.
- Abandonner au vieillissement quelques arbres à l'hectare.



- Mettre en place des **îlots de vieillissement**, voire de **sénescence** au sein des massifs forestiers où l'espèce est présente.

Ces îlots constituent des sites privilégiés de nidification et de nourriture à la fois pour le Grimpereau mais aussi pour une multitude d'autres espèces.



- Des **exploitations forestières interrompues de mi-avril à fin juin, dans les gros bois**, période pendant laquelle les jeunes sont dans les nids.

Remarque : période de montée de sève, de toute façon défavorable à l'exploitation des feuillus.



Gestion environnementale

Actions à favoriser pour une gestion optimale de l'habitat de l'espèce

- Laisser sur pied les arbres dépérissants ou morts principalement de gros diamètre.
- Limiter la fréquentation des zones de nidification d'avril à fin juin.
- Éliminer l'utilisation de produits agropharmaceutiques contre les insectes en particulier.



© J. RIVIERE - GONm

Variante « réserve intégrale »

- Abandon de la récolte de bois qui se dégrade sur pied ou au sol.



Remarque importante - D'après une estimation qui montre que seulement la moitié des jeunes parviennent à l'âge d'envol, le Grimpereau des bois apparaît donc comme une espèce sensible. De plus, le pillage des nids est assez courant, mustélidés, Pic épeiche, Chouette hulotte et petits rapaces en sont les principaux acteurs.